

新型コロナウイルスワクチンは無料でうけられます

任意ではありますが効果や副反応を十分に理解した上で接種に望みましょう

※新型コロナウイルスワクチンの接種は、国と地方自治体による

新型コロナウイルスワクチン接種事業の一環のため公費対象となり希望者は無料です



①接種日までの注意点

- 当日は接種のみです。診察はいたしません
- 2週間以内に 感染症にかかっていた場合は
症状がなくなってから 1 週間はあけてください
ウイルス感染後の場合は2週間あけましょう
- 1 週間以内に風邪薬を服用していないこと（服用終了後 1 週間あける）
- 持病で定期薬のあるかたは事前にかかりつけ医へ接種の確認をとっておきましょう
- 他の予防接種を受けた場合は2週間あけましょう
- 接種後には副反応の可能性ががあります
接種の翌日は予定を入れないようにしたほうがよいでしょう

②接種を受けることができない人

- あきらかに発熱している
- 重い急性疾患にかかっている
- ワクチンの成分に対して重度の過敏症の既往歴がある
（アナフィラキシーショックの既往がある方）
- 当日の体調不良などや医師の判断で接種を控えることがあります

③接種を受けるにあたり注意が必要な人

⇒ かかりつけ医に事前に確認をしてください

- 抗凝固剤(血液サラサラの薬)を服用している
- 過去に免疫不全の診断を受けたまたは近親者にいる方
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患がある
- 過去の予防接種で、接種後 2 日以内に発熱や全身性の発疹やアレルギーが疑われる症状がでた方
- 過去にけいれんを起こしたことがある方
（子供のころの熱性けいれんは入らない）
- 過去に予防接種や採血時に気分がわるくなり失神(迷走神経反射等)を起こしたことがある方

④接種を受けた後の注意点

- 接種後は15分以上待機していただきます
(過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギーを起こしたことがある方などは30分以上)
血液凝固剤(サラサラの薬)を服用されている方は2分以上接種箇所をおさえます
- 注射部位は清潔に保つよう to してください
当日の入浴は問題ありませんが、注射部分をこすらないようにしてください
- 当日の激しい運動は控えてください
- ワクチン接種後もマスクや3密などの感染予防対策の継続をお願いします

⑤副反応について

注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱など、その他症状がでる可能性があります
症状はいずれも2~3日でおさまることが多いです

症状が続くときや心配な時は接種医やかかりつけ医をご受診ください

稀におこる重大な副反応としてショックやアナフィラキシーがありますが、当院では副反応発生時は速やかに対応出来るように準備を整えております。

万が一、夜中に具合が悪くなった場合

(頭痛、発熱、嘔気、接種部の激しい痛みなど)

聖マリアンナ医科大学病院夜間救急センターを受診ください 044-977-8111 (代表)

「ワクチン接種後の副反応で受診しました」と受付で伝えてください

⑥予防接種救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。

極めてまれではあるものの、なくすことは出来ないことから、予防接種法に基づく救済制度(医療費・障害年金等の給付)が設けられています。

⑦接種回数について

ワクチンは2回接種します

ワクチンによって接種間隔が違いますので間違えないようにしましょう

- ワクチンの効果を十分に得るため、2回とも同じワクチンを接種してください

⑧当日朝の確認事項

- 37.5℃以上の発熱がないこと
⇒発熱がある場合は変更のお電話をください
※平熱が普段から低い方は体調によります
- 風邪症状がないこと
⇒症状がある場合は変更のお電話をください
- 当日は車や自転車などでの来院はお控えください
可能な限り公共交通機関や徒歩でお願いいたします
※駐車場は一般診療の方専用です

⑨当日の持ち物(忘れものがあると接種できません)

- 身分証明書(住民票の住所が印字されたもの)
免許証、マイナンバーカード など
- 接種券(バーコードシール)
- 新型コロナワクチン接種の予診票 (事前にご記入ください)
- 定期薬のある場合はお薬手帳
- 2回目の場合は **1回目接種歴がわかるもの**

⑩当日の服装

肩の出る服装(半袖のTシャツなど)
ゆったりとした服



★お電話でのお問い合わせはご遠慮ください

副反応などが出現した場合などを除き、通常診療に影響がでますことから皆様のご協力を切にお願いいたします

神奈川ひまわりクリニック

